

BIOKADİN STANDARDİZE SOLÜSYON

FORMÜL :

Aktif madde: % 10 Povidon iyodür (CAS Numarası 25655-41-8)

Yardımcı maddeler: Nemlendirici %0.80, stabilizer %0.33, tampon düzenleyici %0.36, tampon düzenleyici %0.75, pH düzenleyici %0.13, tampon düzenleyici %0.10, çözücü ad %100

Formülasyon Şekli: Sıvı

KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

ÜRÜN TİPİ: (1) İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

TIBBİ ÖZELLİKLERİ : Povidon iyodür, dezenfektan ve antiseptik olarak özellikle kontamine olmuş yaralarda ve cilt ve mukoza membranların antisepsisi için ameliyat öncesi kullanılır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ : Ameliyatlardan önce , jinekolojik muayene ve doğum sırasında, biyopsi, punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza dezenfektanı olarak ve cerrahide el dezenfektanı olarak kullanılır.

Kullanılacağı zararlı organizmalar: E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. Hirae, C. albicans, Polio virus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus strain S99 Berlin

Uygulama alanı ve şekli: Bakterisit, fungusit ve antiviral, Topikal olarak cilt ve mukozaya

Uygulama dozu: Gerektiği kadar

Uygulama aralığı: Gerektiği kadar

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR : Geniş yüzeyde ve uzun süren tedavilerde manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompoze kalp yetersizliği olan hastalarda , hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Bu durumda olan hastalarda tiroid fonksiyonu gözlenmelidir. Lokal irritasyon veya duyarlılık görüldüğü zaman tedavi durdurulmalıdır.

Vücut boşluğunun irrigasyonu tavsiye edilmemektedir.

Emilen iyod plasental bariyeri geçebileceği ve anne sütüne salgılanabileceği için hamile ve emziren kadınlarda povidon iyodinin devamlı kullanımından kaçınılmalıdır. Sınırlı kullanımlardan herhangi bir advers etki bildirilmemesine rağmen, dikkatli olunması tavsiye edilmeli ve terapötik faydası, emilimin fetal tiroid fonksiyonları ve gelişim üzerine muhtemel etkisine karşı dengede tutulmalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER : Mevcut böbrek yetersizliği olan hastalarda bozulmuş cilde devamlı uygulama yapılması özel dikkat gerektirir. Eşzamanlı lityum tedavisi gören hastalarda devamlı kullanımından kaçınılmalıdır.

İyoda karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır. Povidon iyodürden, iyodun absorbe olması tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerin povidon iyodür ile kontaminasyonu, feçeste gizli kan ve idrarda kan aranması sırasında yanlış pozitif sonuç verebilir. İdiyosenkratik mukozal irritasyon ve hipersensitive reaksiyonları oluşturabilir. İyodinin aşırı absorpsiyonu , metabolik asidoz, hipernatremi ve renal fonksiyonlarda bozukluk oluşturabilir. Biokadin Solüsyon bütün materyallerden sıcak su ve sabun ile çıkarılabilir. Zor çıkan durumlarda amonyak veya sodyum tiyosülfat kullanılır. Doktora danışmadan kullanmayınız.

Aşırı doz iyod guatr ve hipertiroidizm meydana getirebilir.

Zehirlenme belirtileri:Ani olarak alınan aşırı doz, ağızda metalik tad, tükürük salgısında artma, ağız ve boğazda yanma ve ağrı, gözlerde irritasyon ve şişlik, ciltte alerjik reaksiyonlar, gastrointestinal bozukluk ve diare oluşturabilir.

Povidon İyodür LD₅₀ Değeri: 8000 mg/kg (Akut Oral, Rat)

Antidotu ve gerekli bilgiler : Sodyum tiyosülfat ve nişasta iyodu inaktive eder.

İlk yardım önlemleri: Tedavi semptomatik ve destekleyici olarak önerilir. Elektrolit dengesi, renal ve tiroid fonksiyonlar dikkatli olarak takip edilmelidir.

Göze temas etmesi halinde derhal bol miktarda su ile 15 dakika gözlerinizi yıkayın. Yapabiliyorsanız kontak lenslerinizi çıkartın. Yutulduysa kusmaya çalışmayın. Birkaç bardak süt veya su için. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeye çalışmayın. Sağlık kuruluşuna başvurun. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no'lu telefonunu arayınız.

YAN ETKİLER : Povidon iyodür lokal deri reaksiyonları oluşturabilir buna rağmen iyottan daha az tahriş edici olduğu kabul edilir. Povidon iyodürün büyük yaralara veya ağır yanıklara uygulanması metabolik asidoz, hipernatremi renal fonksiyon bozukluğu gibi sistemik advers etkiler oluşturabilir.

Kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Biokadin Solüsyon seyreltilmeden tedavi edilecek yere sürülür. Kuruduktan sonra kolay yıkanabilen bir film oluşur. Islak kompres ve yıkamalar için seyreltik olarak kullanılabilir.

**DİKKAT ! ŞİŞENİN KAPAĞINI AÇINIZ.
TIPANIN ÜSTÜNDEKİ MUHAFAZAYI ÇIKARINIZ**



HARİCEN KULLANILIR, İÇİLMEZ.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta muhafaza ediniz. Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz, güneş almayan serin yerlerde muhafaza ediniz.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,
SİGARA KULLANMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak bertaraf ediniz.

Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30, 100 ve 1000 ml.lik polietilen şişede.

Ruhsat sahibi ve adresi : Biokan Dr. İsmet SÖZEN
Yassıören Mahallesi Fırat Sk. No: 14/1 Arnavutköy /İSTANBUL
TEL: 0212 592 15 76

Ruhsat tarih ve no.: 23/07/2001 2012 / 72

Üretim yeri : Farmamag Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Bağlariçi Caddesi No:14, Avcılar / İSTANBUL
TEL : 0 212 694 33 51

Sadece ECZANELERDE SATILIR.