

KULLANMA TALİMATI

Kansilak Rektal Çözelti 10 g Sorbitol, Gliserin

Rektal uygulanır.

- **Etkin maddeler:** 5,350 g Sorbitol, 3,660 g Gliserin ihtiva eder.
- **Yardımcı maddeler:** Tween 80 , Sodyum Sitrat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ nedir ve ne için kullanılır?

- KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ, 10 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulmaktadır.
- Hamilelikten ileri gelen kabızlıklarda, üç yaş üstü çocukların kabızlıklarında, kabızlığın sorun olduğu hastalıklarda, rektoskopi ve cerrahi müdahale gibi bağırsakların tahliyesi gereken durumlarda, kolon ve rektumdaki kasların zayıf olduğu durumlarda kullanılır.

2. KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ yalnızca rektal yoldan uygulanır.

Kullanmadan önce aplikatörün dışına bir miktar tüp içindeki ilaçtan sürerek kayganlaştırın.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).
- İdrara çıkamama, ağır su kaybı (dehidratasyon), gelişmiş veya gelişmekte olan akciğer ödemi, ağır kalp yetmezliği, akut apandisit, barsak travması iltihabı ve kanamalarında, anüs ve rektuma ait bölgede uygulanan cerrahi müdahalelerden sonra, tifo, fistül, basur (hemeroid), ülserli kolit durumlarında

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Kalp hastası iseniz,
- Böbrek ya da karaciğer probleminiz varsa,
- Şeker (diyabet) hastalığınız varsa,
- Kırmızı kan hücrelerinin harabiyetinden ileri gelen kansızlığınız (hemolitik aneminiz) varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin hamilelik sırasında güvenliliği kanıtlanmamıştır; Hamilelik sırasında kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kansilak Rektal Çözelti sadece gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Yinede bu dönemde sadece gerekli durumlarda kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı özellikle diğer laksatifleri şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

3. KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe üç yaş üstü çocuklar için ½ tüp, büyükler için 1 tüp yeterlidir.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kutu içindeki aplikatörü tüpün ucuna takınız. Aplikatör vasıtasıyla ilacı makata boşaltınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin üç yaş üstü çocuklarda kullanımı, uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar kısmında belirtildiği gibidir.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemeniz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ kullandıysanız KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin fazla kullanılmasının tipik belirtileri karın ağrısı, halsizlik, yorgunluk, susama, kusma, ödem, kemik ağrısı (osteomalaziye bağlı), sıvı ve elektrolit dengesizliği , hipoalbuminemi (protein kaybettiren gastroenteropatiye bağlı) ve barsak iltihabını (koliti) taklit eden belirtilerdir.

Barsak kalıcı olarak hasarlanmamışsa, laksatiflerin yardımı olmadan çalışması aylarca süre gerektirebilir.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacın kesilmesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir etki görülmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek olarak (Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla ve 1000 kişide 1'den az görülen) aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Belirtileri; yüzde, ağızda, dudakta, dilde ve boğazda şişme, nefes darlığı, kaşıntı, ürtiker, ateş v.b.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Gaz çıkarma,

- İshal,
- Barsak ağrısına sebep olabilen barsak tahrişi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'nin saklanması

KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü ışıktan uzakta ve 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Dış ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Kartondaki son kullanma tarihinden sonra KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KANSİLAK REKTAL ÇÖZELTİ'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: KANSUK LABORATUARI San.ve Tic. A.Ş. • Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri : Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. • Çerkezköy- Tekirdağ/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 04.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.